

Behandling af efterstær.

De tilbydes laserbehandling af efterstær.

Når De ankommer til behandlingen, vil De få dryppet øjnene. Selve laserbehandlingen foregår ved at De sidder med hagen og panden støttet som ved en almindelig øjenundersøgelse. Som oftest mærker man slet ikke behandlingen, som tager ca. 10 minutter.

De skal regne med at tilbringe 1 time i klinikken. Det er ikke forsvarligt selv at køre bil efter behandlingen.

Ved operationen for grå stær fjernes det meste af den naturlige linse. Imidlertid efterlades den naturlige linses bageste kapsel i øjet, således at den kunstige linse kan sættes i spænd her. Linsekapslen er tilbøjelig til at blive uklar med tiden. Denne uklarhed af linsekapslen kaldes en efterstær. Hvis efterstæren giver anledning til synsnedsættelse, kan man behandle med laserlys.

Som ved andre behandlinger er laserbehandlingen forbundet med en meget lille risiko. Enkelte patienter kan få en kortvarig trykstigning i øjet, uklarheder i glaslegemet eller regnbuehindebetændelse. Nethindeløsning og hævelsen omkring den gule plet er meget sjældne komplikationer.

Man får en kontrolundersøgelse 1 – 4 uger efter behandling.

Hvis De efter behandlingen får ondt i øjet, pludselig skyggedannelse/nye pletter eller lysglimt i øjet, bedes De straks kontakte klinikken eller den vagthavende øjenlæge.

Med venlig hilsen,

Øjenlæge Chris Lisle