

Forebyggende behandling af akut grøn stær.

De tilbydes forebyggende laserbehandling af akut grøn stær.

Når De ankommer til behandlingen, vil De få dryppet øjnene. Selve laserbehandlingen foregår ved at De sidder med hagen og panden støttet som ved en almindelig øjenundersøgelse. Som oftest mærker man slet ikke behandlingen, som tager ca. 10 minutter. Synet kan være sløret i nogle timer efter behandlingen. Der kan ligeledes optræde hovedpine i nogle timer.

De skal regne med at tilbringe 1 time i klinikken. Det er ikke forsvarligt selv at køre bil efter behandlingen.

Nogle patienter har en risiko for, at afløbet i øjet kan lukke af. Det kan medføre kraftigt trykstigning i øjet (akut grøn stær) og beskadigelse af synet. Ved laserbehandling behandler man regnbuehinden således, at afløbet ikke kan lukke af.

Efter behandling skal man dryppe det behandlede øje med Maxidex øjendråber 3 gange dagligt i en uge.

Som ved andre behandlinger er laserbehandlingen forbundet med en meget lille risiko. Enkelte patienter kan få en kortvarig trykstigning i øjet, uklarheder i glaslegemet, regnbuehindebetændelse, nethindehævelse eller en lille blødning i den forreste del af øjet. En meget sjælden gang kan behandlingen give grå stær.

Man får en kontrolundersøgelse en uge efter behandlingen.

Hvis De efter behandlingen får ondt i øjet, pludselig skyggedannelse/nye pletter, lysglimt eller tiltagende sløring af synet, bedes De kontakte klinikken eller den vagthavende øjenlæge straks.

Med venlig hilsen,

Øjenlæge Chris Lisle